

國立空中大學 **107** 學年度下學期

社區營造與生活

期末考核報告

班級 **1G6101** 教師：王○東老師

學生：黎○平 學號 **1000000000**

關於社區流浪貓議題



（正在排隊吃食物的三只流浪貓，觸及我內心的感慨，隨手拍下這溫暖的畫面。）

（注：以下照片由好友梅子拍攝并提供）

引發的議題：社區流浪貓有人愛有人恨

近些年在社區總有流浪貓的足跡，牠們的出沒似乎與人類不相關，但隨著數量的激增也帶來了不少的隱患。



現況：

據觀察發現：有些喂食流浪貓的人，在餵食的同時沒兼顧到環境的清潔，使得本身就不喜歡貓的人更加的厭惡流浪貓，認為牠們使環境變得更脏亂，去管理中心投訴並要求捕捉，甚至與喂貓人士發生口角爭執，引發鄰里糾紛，使管委會左右為難。





問題評估：

本社區流浪貓數量並非很多，初步調查約有八九只左右，考慮經過良好的治理是可以改善問題的，如果在社區內宣傳文明養寵理念，並在棄養嚴重、晶片植入率仍未提高的大環境下，先用節育手術止住另一個繁殖源頭，再鼓勵眾多民眾一起來參與善待流浪貓的愛心計劃或許會有不錯的效果。面對不同飼養觀念，來採取不同之絕育策略，再配合認養、安養、及放養來細心的處理流浪貓問題。



初步的執行計劃：

- 1、在社區張貼文明餵貓的公告，并召集社區的愛貓人士及愛心人士共同參與助貓計劃，以達財力互補齊心協力完成社區助貓的目標！



- 2、徵召流浪貓的自願照顧人員 3~5 人，共同協商照顧的時間，并努力去開發送養或改善共養空間。

- 3、諮詢相關部門如何捕捉并施行節育、相關地址及費用，以及所要注意的各種細節。




YouCam



節育前後的注意事項：

手術時機：應該在貓的生理成熟以及器官發育成熟之後較理想。

手術前：需確保貓的健康狀況良好，打過疫苗，術前 24 小時禁食，術前 4 小時禁水，可減少手術麻醉的風險，以及便于術後盡早恢復食慾。準備乾淨的器具及被單，以備貓手術後可舒適的休息。要給貓準確的量體重，因體重是醫生要給貓注射多少的麻醉藥量的依據。



手術後：給予安靜的環境休養，注意傷口護理，避免感染，另外還要給貓滴眼藥水，由於麻醉之後眼睛不能閉合，玻璃體長時間暴露在外會流失水分，滴些眼藥水幫助恢復視力。約術後 3 小時再喂食配方貓罐頭，幫助盡快恢復體力，餵食兩天後再換成普通貓糧即可。



問題的解決之道：

- 1、必須從我們本身的自我教育反省，要認識到地球並非單獨為人而存在，而應尊重其他物種之生存權。
- 2、需協助流浪貓降低族群數量配合認養與安養，以提升流浪貓的生活品質。



- 3、以人道主義捕捉流浪貓，施以絕育手術，並以剪耳作為標記以避免重複捕捉，之後再放回社區居住地，繼續有社區的照顧者提供各項生活照顧。
- 4、對於老弱殘病或攻擊性，對居民造成重大困擾之流浪貓，送去收容所由專家來處理。
- 5、建議愛貓人士領養，對流浪貓來說最理想的歸宿，莫過於有一個溫暖的家，當然此種上上策是可遇不可求的。



6、結合獸醫師、寵物贊助商等社區資源，設立定點餵食小站，讓貓與人類和平共處。邀請民眾一起建立友善社區，包括寵物友善餐廳與平常貓咪容易出沒的地點，提醒來往車輛與民眾隨時注意。



YouCam

預期成效：

讓社區流浪貓安全又不受打擾，同時預防流浪貓被虐殺的悲劇上演，實施結育后，幫助社區控制流浪貓的繁殖，有效控制流浪貓的數量。并帶來的以下好處：

- 一、在春秋二季，貓咪發情期時可以不用在半夜聽到貓叫聲，公貓打架嘶吼聲。
- 二、公貓(及少許母貓)不會因為發展地域而噴尿，環境清潔得以改善。
- 三、貓咪的萌樣也會給人們帶來愉悅的心情。



結語：

歸結於問題之根源：流浪貓數量過多導致與人之間摩擦益增，然而流浪貓無法自行控制生育，人門又普遍做不到地球資源共享。在此呼籲社區居民，在尊重生命的原則下，以人道的方式解決人與流浪貓共處的困境。提出此對策廣泛推行有效絕育策略，并輔助適當之認養及安養，以避免流浪貓數量過多之問題。



生命之所以珍貴，就是因為只有一次，不管是人的生命，還是動物的生命，都是一樣的。熱愛生命、關注生命、歌頌生命，珍視生命是人類在發展過程中反思自己的行為而發出的真誠呼喚。



YouCam



（感謝好友梅子拍攝并提供以上照片！）

END